



**ДЕРМАФИЛ**  
**DERMAFIL**

**ИННОВАЦИОННАЯ НИТЬ  
ДЛЯ ВАГИНАЛЬНОГО  
СУЖЕНИЯ**



Фарм БСК

<http://www.fambsk.ru> <http://fam-bsk.ru/>  
Тел. +7 (495) 934-33-11, +7 (495) 934-17-01

# Малоинвазивная перинеопластика



Опушения и выпадения внутренних половых органов является одной из самых важных гинекологических проблем.

Среди женщин репродуктивного возраста частота пролапса составляет 15-30 %, а у женщин после 50 лет- 40%.

Клинические проявления и дисфункции тазовых органов приносят женщинам физические и моральные страдания, негативно влияют на состояние общего здоровья, сексуальную активность, снижают трудоспособность, приводят к депрессии, неврозам, отчужденности личности от общества, разладам в семейной жизни.

## Причины развития пролапса гениталий:



- Несостоятельность связочного аппарата матки и тазового дна, к которой приводит родовой травматизм, роды через естественные родовые пути, особенно если их было 2 и больше, если они протекали с осложнениями, с большими и плохо заживавшими разрывами, применением акушерских щипцов и т.д. Эстрогенная недостаточность, возрастные изменения мышечной и соединительной ткани.
- Повышенное внутриутробное давление. Тяжелый физический труд, поднятие тяжестей, хронический кашель, хронические запоры, ожирение.
- Врожденная неостаточность (дисплазия) соединительной ткани. Наследственность. Часто это связано с особенностями строения соединительной ткани, входящей в состав связок, которая склонна к растяжениям или разрывам. Частое сочетание пролапса с грыжами другой локализации, спланхноптозом, варикозной болезнью, гипермобильностью суставов указывает на возможность генетически детерминированной дисплазии соединительной ткани.

# Показания к применению




- Эпизиотомия
- Дисбиоз влагалища
- Зияние половой щели
- Послеродовая реабилитация
- Стрессовое недержание мочи
- Начальные проявления пролапса
- Сексуальная неудовлетворенность
- Ургентные позывы к мочеиспусканию
- Птоз промежности у женщин после 40 лет
- Посторонние звуки при половом акте и физических нагрузках
- Не удовлетворенность внешним видом аногинетальной области
- Дискомфорт при половой жизни (невозможность сократить мышцы тазового дна)
- Малоинвазивная перинеопластика с использованием нитей Дермафил кардинальное решение в антивозрастной и восстановительной терапии вагинальной ткани.

# Нить Дермафил

## для вагинального сужения это:

- Рассасывающаяся
- Двухнаправленная, сходящаяся
- Монофиламентная с насечками
- Состав P(LA\_CL) полилактид с поликапролактоном с двумя атравматическими прямыми иглами на концах
- Игла треугольная, длинна 60 мм
- Длина нити 40 см
- Толщина нити USP 0
- Период рассасывания нити 18 месяцев
- В упаковке 6 нитей в индивидуальной упаковке



## Принцип действия нитей Дермафил

- Нить инициирует фиброзную реакцию, которая приводит к так называемому «вторичному вектору тяги», который остается даже после полного рассасывания нити
- Эффект сохраняется до 36 месяцев




## Преимущества нитей Дермафил

- Эстетическое и функциональное улучшение
- Профилактика пролапса гениталий
- Не требует в последующем родоразрешения путем операции кесарева сечения
- Малоинвазивная процедура
- Местная анестезия
- Быстрый восстановительный период без потери работоспособности
- Хорошая альтернатива хирургическим методам




## Техника вагинального сужения


Мускулатура тазового дна состоит из диафрагмы таза (лобково-копчиковая и подвздошно-копчиковая мышцы, копчиковая мышца и наружный сфинктер заднего прохода), мочеполовой диафрагмы и двух поперечнополосатых мышц — седалищно-пещеристой и луковично-губчатой.








Промежность в норме




Состояние мышц после родов:  
когда мышцы разорваны ничего  
не держит прямую кишку на ме-  
сте




# ЗОНА ПОСТАНОВКИ НИТЕЙ


**ДЕРМАФИЛ**  
**DERMAFIL**  
ИННОВАЦИОННАЯ НИТЬ ДЛЯ ВАГИНАЛЬНОГО СУЖЕНИЯ




# ФОРМИРОВАНИЕ МАЛОГО «РОМБА»



# ФОРМИРОВАНИЕ БОЛЬШОГО «РОМБА»



# ЗАВЯЗЫВАЕМ УЗЛЫ





# Результаты

ДО



после



ДО



спустя 2 года



ДО



спустя 3 года



# Результаты



- Профилактика генитального пролапса, на ранних стадиях
- Сужение входа влагалища
- Восстановление тонуса мышц промежности у женщин перименопаузального периода
- Улучшение качества сексуальной жизни и социального благополучия
- Профилактика инфекционных осложнений влагалища
- Послеродовая реабилитация



# КОНТАКТЫ



**Адрес: Москва, Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, 1 корпус 1**  
**Телефоны: +7 (495) 934-17-01, +7 (495) 934-33-11, +7 (495) 439-64-28,**  
**+7 (495) 439-77-62, +7 (499) 730-08-52, +7 (499) 730-08-53, +7 (925) 048-99-78**

**E-mail: [info@farmbsk.ru](mailto:info@farmbsk.ru)**

